

Sjekkliste 2:

Sjekkliste for deksamfetamin for overvåking av pågående behandling



Følgende skal støtte under overvåking av pågående behandling med deksamfetamin av relevante pasienter med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

Som den godkjente preparatomtalen (SPC) forklarer nærmere, bør vekst samt psykiatrisk og kardiovaskulær status overvåkes regelmessig:

- Blodtrykk og puls bør registreres i en prosentoversikt ved hver dosejustering og så minst hver 6. måned
- Høyde, vekt og appetitt bør registreres minst hver 6. måned, og føres i et vekstdiagram
- Utvikling av de novo eller forverring av eksisterende psykiatriske lidelser, inkludert depresjon og aggressiv eller fiendtlig atferd, bør overvåkes ved hver dosejustering og så minst hver 6. måned og ved hver avtale
- Pasientene bør overvåkes for risiko for videreformidling av legemidlet, misbruk eller feil bruk.

Det anbefales at denne sjekklisten brukes sammen med den godkjente preparatomtalen (SPC) for preparatet.

Les gjennom denne sjekklisten før konsultasjonen. Den utfylte sjekklisten kan vedlegges som dokumentasjon i pasientjournalen.

Etter som du jobber deg gjennom sjekklisten, kan det være nyttig å diskutere pakningsvedlegget for preparatet med pasienten og dennes forelder/foreldre eller verge(r).

Overvåking under pågående behandling med deksamfetamin

Dato for vurdering:	
Årsak til vurderingen:	
Pasientens navn:	
Fødselsdato:	
Alder:	
Kjønn:	

Gå nøye gjennom følgende systemer som angitt nedenfor ved hver dosejustering og ved oppfølgingsavtalene minst hver 6. måned.

Generelle medisinske funn	Evaluert (✓ som relevant)
<ul style="list-style-type: none">• Dokumenter høyde, kroppsvekt og appetitt (se separat oppfølgingsdiagram)	
Vurder seponering av deksamfetamin hvis veksten er mindre enn forventet	
<ul style="list-style-type: none">• Dokumenter eventuelle tegn på misbruk, feil bruk eller videreformidling av deksamfetamin	
<ul style="list-style-type: none">• Graviditet	
Det anbefales å avslutte behandlingen	

Nye kardiovaskulære funn	Blodtrykk og puls bør registreres
<ul style="list-style-type: none">• Palpitasjoner	
<ul style="list-style-type: none">• Brystsmerter ved anstrengelser	
<ul style="list-style-type: none">• Uforklart synkope	
<ul style="list-style-type: none">• Andre symptomer som kan tyde på hjertesykdom	
Henvis til evaluering hos hjertespesialist umiddelbart	

Nye neurologiske funn	
<ul style="list-style-type: none"> • Kraftig hodepine, nummenhet, svekkelse eller lammelse, nedsatt koordinasjon, syn, tale, språk eller hukommelse 	
Enhver av tilstandene ovenfor kan antyde cerebral vaskulitt: stans behandling med deksamfetamin	
<ul style="list-style-type: none"> • Anfallsfrekvensen øker eller nye anfall oppstår 	
Deksamfetamin må seponeres	

Nye psykiatriske funn eller forverring av disse	Utvikling av de novo eller forverring av eksisterende psykiatriske lidelser må overvåkes
<ul style="list-style-type: none"> • Psykotiske eller maniske symptomer 	
Vurder å seponere deksamfetamin	
<ul style="list-style-type: none"> • Selvmordstanker eller -atferd 	
Vurder behandling av underliggende psykiatrisk lidelse	
Re-evaluer nytte/risiko	
Vurder å seponere deksamfetamin	
<ul style="list-style-type: none"> • Aggressiv og fiendtlig atferd 	
Vurder behovet for behandlingsjustering	
<ul style="list-style-type: none"> • Angst, opphisselse eller anspenhet 	
<ul style="list-style-type: none"> • Depresjonssymptomer 	
<ul style="list-style-type: none"> • Motoriske eller verbale tics eller forverring av slike 	
Behandlingsvarighet	
<ul style="list-style-type: none"> • Pasienten behandles kontinuerlig i > 12 måneder 	
<ul style="list-style-type: none"> • Symptomforbedring etter egnet dosejustering over en periode på 1 måned er observert, eller anbefales seponering av legemidlet 	
Vurder en prøveperiode uten medisinerer minst én gang årlig for å bestemme om fortsatt behandling fremdeles er nødvendig	

Registrer eventuell tilleggsinformasjon her

Etter evalueringen ovenfor, fylles vedlagte oversikt ut for å registrere et baselinemål for pågående overvåking.
(Se: Oversikt for pågående overvåking av behandling med deksamfetamin).